

大腸ポリープ切除術 で入院をされる _____ 様へ

月日 経過	(/) 外来	(/) 入院当日 (治療前)	(/) 入院当日 (治療後)	(/) 退院日
薬と点滴	治療前日の寝る前に下剤を内服してください。糖尿病薬や抗血栓薬等の内服は、医師の指示に従ってください。	内服している薬があれば看護師にお伝えください。継続するか医師に確認をします。点滴の針を挿入し、15時前後より点滴を投与開始致します。	消灯前まで点滴を投与を行います。点滴の針は抜かずに入れたままで保護をします。	医師の診察後、点滴の針を抜きます。抗血栓薬の再開は医師の指示に従ってください。退院時に薬が処方されることがあります。
検査・処置		入院後、ガスコン、ドンペリドンを内服します。内服した30分後に2Lの下剤を2時間以上かけて内服します。便が黄色になったら看護師に見せてください。排便回数を教えてください。便にカスが残っている場合は下剤の追加内服や浣腸をかけさせていただきます。		
食事	消化の良い食事を摂取してください。	朝から食止めです。水やお茶はひかえてください。	治療後1時間、血圧や体温、腹部症状の異常がないことを確認後、夕食より食事が始まります。(配膳された食事のみ摂取してください)お茶お水は飲むことができます。	配膳された食事のみ摂取してください。
行動	制限はありません。	制限はありませんが、排便の回数が増えるためなるべく病棟内でお過ごしください。	治療後1時間はベット上安静です。お手洗いの際は、ナースコールを押してください。お手洗いまで付き添います。1時間後に血圧や体温測定をおこないます。異常がなければ病棟内自由です。着替えは看護師がお手伝いします。	制限はありません。
ご説明、看護	※外来で説明を受けた同意書や問診票、短期滞在書を入院時に持参してください。※お薬手帳や内服薬を入院時に持参してください。	※看護師より治療に関するオリエンテーションをおこないます。※抗血栓薬や糖尿病薬を内服している方はお知らせください。※吐き気や気分不快、赤色の便が出た時は、ナースコールでお知らせください。※上着、シャツを脱ぎ検査着に着替えませす。ズボンや下着を脱ぎ、こちらからお渡しする使い捨てパンツをはいてください。※指輪や入れ歯や時計などの装身具は全てはずしてください。	※便の性状を確認していただき、赤色や黒色の便が出たときは、流さずにナースコールにてお知らせください。※腹痛や気分不快があるときはお知らせください。	※看護師より退院時パンフレットをお渡しします。※次回外来予約票や診察券をお渡しします。

上記のスケジュールにそっての入院生活になる予定です。予定は変更になる場合があります。ご不明な点は、遠慮なくお尋ねください。

注1) 病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得ることがあります。

注2) 入院期間については、現時点で予測されるものです。