

## 1-M8 手術・検査前の推奨休薬期間

下記の推奨休薬期間はあくまでも目安である。凝固機能に影響を及ぼす薬剤については出血時間やプロトロンビン時間の確認を行い、患者の状態や、手術、検査、処置による侵襲や出血の程度などを考慮して、総合的に判断すること。また、投与を中止することにより、疾患に悪影響を及ぼす可能性もあることから、症状を確認の上、休薬期間を設定すること。

(1) 血小板凝集抑制剤、抗凝固薬等

赤字：当院採用薬、★：院外採用医薬品

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
血小板凝集抑制剤	アスピリン	アスピリン	バイアスピリン	1週間以上
		バファリン		
		タケルダ配合錠★		
		キャブピリン配合錠		
	イコサペント酸エチル	エパデールS エパデールEM	イコサペント酸エチル	7~10日前
	オザグレル塩酸塩	ドメナン		1日前
		カタクロット注射液	オザグレルNa点滴静注	
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	オメガ-3脂肪酸エチル	7~10日前
	クロピドグレル硫酸塩	プラビックス	クロピドグレル	14日以上前
		コンブラビン★ (クロピドグレル +アスピリン)	ロレアス配合錠	14日以上前
	チカグレロル	ブリリント		5日以上前
	サルボグレラート塩酸塩	アンブラーグ	サルボグレラート塩酸塩	1日前
	シロスタゾール	プレタールOD	シロスタゾールOD	2~4日前
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン	チクロピジン	10~14日前
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント エフィエントOD		14日以上前
ベラプロストナトリウム	プロサイリン ドルナー ベラサスLA ケアロードLA	ベラプロストNa	1日前	
リマプロスト アルファデクス	オパールモン	リマプロスト アルファデクス	1日前	
抗凝固剤	アピキサバン	エリキユース		低リスク 1日以上前 中~高リスク 2日以上前
	エドキサバン	リクシアナOD		1日以上前
	ダビガトランエテキシラ ートメタスルホン酸塩	プラザキサ		1日前 (大手術 2日以上前)
	ヘパリンナトリウム	ヘパリンナトリウム		4~6時間前
	ヘパリンカルシウム	ヘパリンカルシウム		12時間前
	リバーロキサバン	イグザレルトOD	リバーロキサバンOD	1日以上前
	ワルファリンカリウム	ワーファリン ワルファリンK		2~4日前

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
冠血管拡張剤	ジピリダモール	ペルサンチン	ジピリダモール	1 日前
	ジラゼブ塩酸塩	コメリアンコーワ	ジラゼブ塩酸塩	3 日前
	トラピジル	ロコルナル	トラピジル	2 日前
	トリメタジジン塩酸塩	バスタレルF		不明 (血小板凝集抑制作用)
脳循環代謝改善薬	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	イフェンプロジル酒石酸塩	2 日前
	イブジラスト	ケタス★		3 日前
	ニセルゴリン	サアミオン	ニセルゴリン	2 日前

(2) 女性ホルモン関連製剤：血液凝固能が亢進され、血栓症のリスクがあがる

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロンH★	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠	禁忌：術後1 週間
低用量ピル	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	シンフェーズ T28		禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	アンジュ★ ラベルフィーユ トリキュラー		禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	マーベロン ファボワール		禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
卵胞・黄体ホルモン配合剤	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ヤーズ配合錠★ ヤーズフレックス配合錠★	ドロエチ配合錠	禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ルナベル配合錠★	フリウエル配合錠	禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	ジェミーナ配合錠		禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
	エストロール水和物・ドロスピレノン	アリッサ配合錠		禁忌：術前 4 週間 術後 2 週間
卵胞ホルモン	結合型エストロゲン	プレマリン錠		注意：術前 4 週間
ホルモン類似製剤	ラロキシフェン	エビスタ★	ラロキシフェン塩酸塩	禁忌：術前 3 日-術後歩行開始まで
	バゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント★	バゼドキシフェン	長期不動状態に入る前に休薬し、完全歩行可能になるまで再開しない

### (3) SGLT2 阻害薬

周術期におけるストレスや絶食により、ケトアシドーシスが惹起される危険性がある

分類	一般名	先発薬品名		推奨休薬期間
SGLT2 阻害薬	イブラグリフロジン レプロリン	スーグラ★	スー ज्याヌ配合錠★	術前 3 日前
	エンパグリフロジン	ジャディアンス	トラディアンス配合錠★	
	カナグリフロジン	カナグル	カナリア配合錠★	
	ダバグリフロジン	フォシーガ		
	トホグリフロジン	デベルザ		
	ルセオグリフロジン	ルセフィ		

### (4) サプリメント・健康食品

手術や処置に影響が出る場合があるため、手術・処置の 2 週間前から内服を中止する（注意が必要なサプリメント：朝鮮人参、EPA・DHA、ニンニク成分、プロポリスなど）。

2022 年 2 月 作成

2024 年 4 月 改訂

2024 年 11 月 改訂

2025 年 4 月 改訂

2026 年 4 月 確認