

# ドセタキセル

## ◆点滴に使用する薬と点滴時間

点滴時間：1時間

使用する薬	外観	点滴時間
ドセタキセル 75mg/m <sup>2</sup>		1時間

## ◆ 内服薬

ステロイド剤を内服で使用します。

お薬の名前	飲み方
プレドニン® 	1回 ___錠 1日 ___回 食後

- ・ 薬の量は、副作用の程度などにより変更されることがあります。
- ・ 点滴時間はあくまで目安であり、時間が前後することがあります。

## ◆ スケジュール

21日間を1コースとして治療を繰り返します。

## ◆ 主な副作用

### 白血球減少

白血球が減少すると免疫力が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。

治療開始1～2週間後に白血球の値が最も低くなり、その後1～2週間かけて回復します。

うがい・手洗いなどの感染予防を心がけましょう。

37.5度を超える発熱時、医師からあらかじめ処方された薬がない方は、病院へご連絡ください。

### 赤血球減少

貧血になり、めまい、だるさ、動悸、息切れなどの症状があらわれます。治療開始2～4週間頃に低くなります。

必要に応じて、薬で治療したり輸血があります。

### 血小板減少

血液が固まりにくくなり、歯茎からの出血や鼻血が出やすくなります。治療開始1～2週間後に血小板の値が最も低くなり、その後1～2週間かけて回復します。

転倒やケガに注意してください。

必要に応じて、輸血があります。

### 【血液検査について】

副作用の確認のために、定期的な血液検査を行います。

## ◆点滴中

下記の赤字の症状があるときは、すぐに医療スタッフへお声かけください。

### 過敏反応（アレルギー）

寒気、吐き気、頭痛、めまい、発疹、息苦しい

治療開始1～2回目が起きやすいですが、治療を繰り返していても現れることがあります。

### 血管外漏出

点滴が漏れている、針を刺したところが痛い、熱っぽい、赤く腫れている、違和感がある

## ◆点滴終了後～1週間頃

### 吐き気・嘔吐・食欲不振

必要に合わせて、吐き気止めでしっかりと予防を行っています。  
それでも症状がある場合は、[吐き気止めを追加で使用する](#)ことがあります。[水分が摂れないほど吐き気・嘔吐がひどい場合は、ご連絡下さい](#)

### 便秘

お腹の動きが悪くなり、便が固くなったりお腹がはることがあります。食事や水分摂取、適度な運動でも改善しない場合、[下剤を使用](#)します。

### 関節痛・筋肉痛

肩や背中、腰、手足の関節などが痛くなることがあります。  
[温めたりマッサージをすると改善](#)することがあります。[痛み止めを使用](#)することができます。

### 発疹

皮膚が赤くなる、かゆみが出ることがあります。  
[刺激の少ない肌着を着用](#)しましょう。[塗り薬やかゆみ止めの内服薬を使用](#)することができます。  
[治療開始後数日以内に全身に発疹やかゆみが出る、目の粘膜や唇がたたれる、発熱を伴う場合などはすぐに病院へ連絡](#)してください。

### 倦怠感（だるさ）

疲れやすい、気力がない、体が重いなどの症状で、日常生活に支障が出る場合は、[診察時に主治医へご相談](#)ください。

## ◆ 1~2週間頃

### 下痢

普段より1日4回以上多く排便がある、または1回でも水のような便があるときは、[下痢止めを使用](#)することができます。

[強い腹痛や発熱を伴う場合、医師から処方された下痢止めで改善しない場合は、ご連絡ください。](#)

### 口内炎

口の中がヒリヒリする、しみる、痛くなることがあります。

[歯みがきやうがいで口の中を清潔に保ち、乾燥を防ぐことが大切です。](#)  
[またうがい薬や塗り薬を使用することができます。](#)

[がまんできない、水分もとれないほどの口の中の痛みがある場合は、病院へご連絡ください。](#)

## ◆ 2~3週間頃

### 手足症候群

手のひらや足の裏に、赤く腫れる、ひび割れ、水ぶくれなどの症状がでます。

痛みを伴い、ひどくなると生活に支障が出ます。症状の強さ、薬の種類によっては、フローズングローブを使用することができます。

[保湿剤（市販のハンドクリーム使用可）を塗り、予防しましょう。](#)

[手足へ過度な負担をかけないようにしてください。](#)

### 脱毛

薬の種類によって抜けやすさは異なりますが、1~2か月後にはかなり目立つようになります。

髪の毛以外（まゆ毛、まつ毛など）全身の体毛も同様に抜けます。  
治療が終了すると、少しずつですが生えてきます。

## ◆蓄積性の副作用

### 末梢神経障害（手や足の感覚が鈍くなる、しびれ）

治療を長く続けると少しずつ悪化し、しびれや痛みが持続するようになります。治療を終えても回復に時間がかかります。

手先をうまく使えずボタンがかけづらい、転倒しやすいなど、**日常生活に支障が出る前に、診察時に医師に相談してください。**

### 浮腫

下半身がむくみやすくなります。予防にステロイドを使用することがあります。

### 爪障害

爪が厚くなる、表面がでこぼこする、2枚爪になる  
症状の強さによっては、点滴中に手足を冷やすフローズングローブを使用することができます。

### 色素沈着

皮膚に日焼けのようなしみができる、爪が黒ずむ

### 味覚障害

味を感じにくくなる、塩味を強く感じる、金属味がする、まずく感じるなど味覚に異常が出ることがあります。

### ● その他の副作用

非常にまれな副作用ですが、万が一**赤字の症状**がある場合は、すぐに病院へご連絡ください。

### 間質性肺炎

**たんが絡まない乾いた咳、息苦しい、発熱**

### 肝機能障害

定期的な血液検査を行います。

**白目や皮膚が黄色くなる（黄疸）、ひどいだるさ**

## ◆ 緊急時の連絡方法

困ったことがあったときは、下記にご連絡ください。

気持ち悪くて水分も摂れない  
下痢が止まらない  
37.5°C以上の発熱が続いている  
薬の使用方法がわからない

など



診察券を用意する

代表：044-977-8111 に電話をかける

平日：8:30-17:00  
土曜日：8:30-12:30

腫瘍センター  
ナースステーション

夜間帯・休診日  
など左記以外の時間

各診療科の当直医

## ◆ 予約外受診の方法

病院本館正面玄関を入って右手の  
「②再診受付」または「予約外受付機」で手続きした後、  
各診療科の外来でお待ちください。

※受付時間：平日8:30-11:30 土曜日8:30-11:00

- 生活上の注意については、別冊のパンフレットもご参照ください。
- ご不明な点がある場合は、遠慮なく医療スタッフにお尋ねください。

薬剤師