

# オプジー<sup>®</sup>

## ◆点滴に使用する薬と点滴時間

点滴時間：30分

使用する薬	外観	点滴時間
オプジー <sup>®</sup> 480mg/body		30分

- ・ 薬の量は、副作用の程度などにより変更されることがあります。
- ・ 点滴時間はあくまで目安であり、時間が前後することがあります。

## ◆スケジュール

28日間を1コースとして治療を繰り返します。

### 【血液検査について】

副作用の確認のために、定期的な血液検査を行います。

## ◆点滴中

下記の赤字の症状があるときは、すぐに医療スタッフへお声かけください。

### 過敏反応（アレルギー）

寒気、吐き気、頭痛、めまい、発疹、息苦しい

治療開始1～2回目が起きやすいですが、治療を繰り返していても現れることがあります。

### 血管外漏出

点滴が漏れている、針を刺したところが痛い、熱っぽい、赤く腫れている、違和感がある。

# オプジーボ®を投与される方へ

免疫異常により全身に様々な症状が起こる可能性があります。以下は、主な症状と可能性のある副作用です。症状がある場合は病院へご連絡ください。

## 発現部位が限られる症状

嘔吐、精神状態の変化  
→脳炎

かすみ目、まぶしく感じる  
視力低下  
→ぶどう膜炎

乾いた咳、息苦しさ  
息切れ  
→間質性肺炎

めまい、動悸、意識の低下  
→心臓障害

皮膚や白目が黄色くなる  
→肝臓障害

ひどい下痢、血便、黒い便  
→大腸炎

尿量が減る、血尿が出る  
むくむ  
→腎臓障害

## 全身に出る可能性のある症状

疲れやすい、体重の増減  
いろいろや物忘れしやすい  
体がだるい  
→甲状腺、下垂体、副腎などの  
内分泌機能異常

発疹、水ぶくれ、ひどい口内炎  
→重症な皮膚障害


息苦しさ、手足に力が入らない  
ものが二重に見える、筋肉痛  
→重症筋無力症

のどが乾く、水をよく飲む  
だるい  
→1型糖尿病

皮膚のあざ、  
口や鼻から出血しやすい  
→血小板減少症

運動・感覚まひ  
手足のしびれや痛み  
→神経障害

足のむくみ、痛み、胸痛  
→静脈血栓塞栓症



## **甲状腺・下垂体・副腎機能障害**

甲状腺や下垂体、副腎はホルモンを分泌して体内の機能を保つ組織です。ホルモン値の変動にあわせて、お薬を使用することがあります。

## **間質性肺炎**

たんが絡まない乾いた咳、息苦しい、発熱などが急に現れる、または以前から症状があり、その症状が急に悪くなった場合は病院へご連絡ください。レントゲンで定期的に検査します。

## **皮疹・皮膚炎、白斑**

皮疹がでたり、皮膚が赤くなるまたは白くなることがあります。

症状に応じて飲み薬やぬり薬を使います。

全身への皮疹やかゆみが強い時、またはひどい口内炎やまぶた・目の充血、粘膜のただれ、発熱をともなう場合は病院へご連絡ください。

## **下痢・大腸炎**

軟便、もしくは明らかな排便回数の増加がみられることがあります。

血便や黒色便、腹痛を伴う場合は、下痢止めを使用せず病院へご連絡ください。

## **肝機能障害**

肝臓の働きが低下することがあるため、定期的に血液検査を行い、肝臓の働きを確認します。お酒やサプリメント、健康食品でも肝臓の働きが低下することもあります。これらを服用中の方は、主治医に申し出て下さい。白目や皮膚が黄色くなる（黄疸）、ひどいだるさがある場合は、病院へご連絡ください。

## **腎機能障害**

腎臓がうまく働かなくなることがあります。腎臓の働きが悪くなるとお薬が体内から抜けにくくなり、副作用が強く出る場合があります。

尿量の減少、全身のむくみがある場合は、病院へご連絡ください。

## **重症筋無力症・筋炎**

体に力が入らない、まぶたが下がる、筋肉が痛いなどある場合は、病院ご連絡ください。

## **脳炎・髄膜炎**

頭痛、吐き気、意識が薄れる、首を前に曲げにくい場合は、病院へご連絡ください。

## **糖尿病・糖尿病性ケトアシドーシス**

からだがだるい、のどの渴き、尿量が増える場合は、病院へご連絡ください。定期的な尿検査を行いますが、ご自宅でも尿糖検査での自己チェックをお願いします。

# 免疫チェックポイント阻害薬における高血糖の早期発見のために

免疫チェックポイント阻害薬は、免疫のしくみ（免疫機能）を利用した治療です。がん細胞を攻撃する作用がある一方で、様々な副作用を認めることができます。頻度は稀ですが特に、急激に発症する劇症1型糖尿病は命に関わる副作用であるため、十分な注意が必要になります。

劇症1型糖尿病の初期症状：上気道炎症状（発熱、咽頭痛など風邪のような症状）  
全身倦怠感（しんどい、だるい）  
消化器症状（上腹部痛（おなかのいたみ）  
吐き気（むかむかする）、嘔吐など）

高血糖の症状：口渴、多飲、多尿、体重減少、全身倦怠感、意識障害

血糖値が高くなっていないかを簡便に知る方法として尿糖をチェックする方法があります。尿糖チェックは、手軽に現在の血糖の状態を間接的に知ることができ、糖尿病の発見に大変有用です。そのため、試験紙を購入頂き、自宅で検査していくことをお勧めしています。

近隣のドラッグストアや薬局、もしくはインターネットで「**新ウリエース®Ga**」を購入してください。  
30枚入りで990円です。

## 検査するタイミング

### 治療開始前（ベースライン）

- 朝起きて、最初の尿


### 治療開始後 2~3日毎

- 朝起きて、最初の尿
- 倦怠感など通常と違うと感じたとき（随時）


(1) 約1秒間、試験紙に尿をかけます




(2) 30秒後に、色調表と比較して、判定します



(3) 判定後は、そのままトイレに捨てられます



色調表



緑色に変化したら、  
要相談!!!!

## ◆ 緊急時の連絡方法

困ったことがあったときは、下記にご連絡ください。

気持ち悪くて水分も摂れない  
下痢が止まらない  
37.5°C以上の発熱が続いている  
薬の使用方法がわからない

など



診察券を用意する

代表：044-977-8111 に電話をかける

平日：8:30-17:00  
土曜日：8:30-12:30

腫瘍センター  
ナースステーション

夜間帯・休診日  
など左記以外の時間

各診療科の当直医

## ◆ 予約外受診の方法

病院本館正面玄関を入って右手の  
「②再診受付」または「予約外受付機」で手続きした後、  
各診療科の外来でお待ちください。

※受付時間：平日8:30-11:30 土曜日8:30-11:00

- 生活上の注意については、別冊のパンフレットもご参照ください。
- ご不明な点がある場合は、遠慮なく医療スタッフにお尋ねください。

薬剤師