

# アーゼラ®

## ◆ 点滴に使用する薬と点滴時間

- ・初回:5時間
- ・2回目以降:4時間30分~5時間

使用する薬	外観	点滴時間
過敏症予防① ソル・コーテフ®		〔 アーゼラ®開始の 1時間前に点滴 ※2、9回目のみ 〕
過敏症予防② アセトアミノフェン錠200mg 1回2錠		〔 アーゼラ®開始の 30分前に内服 〕
過敏症予防③ ポララミン®、デカドロン® ※デカドロン®は、初回のみ		30分
<b>アーゼラ®</b> <b>初回:300mg</b> <b>2回目以降:2000mg</b>		初回:4時間30分  2回目: 4時間~4時間30分

- ・ 過敏症予防のポララミン®による眠気が出ることがあるため、ふらつき、転倒に注意し、投与当日の車の運転は行わないでください。
- ・ 薬の量は、副作用の程度などにより変更されることがあります。
- ・ 点滴時間はあくまで目安であり、時間が前後することがあります。

## ◆ スケジュール

- ・8コース目まで:7日間を1コースとして、治療を繰り返します。  
8コース目のあと4~5週間休薬します。
- ・9~12コース:28日間を1コースとして、治療を繰り返します。

## ◆ コース数

- ・計12コース行います。

## ◆ 点滴中

下記の赤字の症状があるときは、すぐに医療スタッフへお声かけください。

## 過敏反応(アレルギー)

寒気、吐き気、頭痛、めまい、発疹、息苦しい

治療開始1～2回目ができやすいですが、治療を繰り返していても現れることがあります。

## 血管外漏出

点滴が漏れている、針を刺したところが痛い、熱っぽい、赤く腫れている、違和感がある

## ◆ 緊急時の連絡方法

困ったことがあったときは、下記にご連絡ください。

気持ち悪くて水分も摂れない  
下痢が止まらない  
37.5℃以上の発熱が続いている  
薬の使用方法がわからない など



診察券を用意する

代表:044-977-8111 に電話をかける

平日 :8:30-17:00  
土曜日 :8:30-12:30

血液内科の  
主治医または担当医

夜間帯・休診日  
など左記以外の時間

血液内科の当直医

## ◆ 予約外受診の方法

病院本館正面玄関に入って右手の  
「②再診受付」または「予約外受付機」で手続きした後、  
各診療科の外来でお待ちください。

※受付時間:平日8:30-11:30 土曜日8:30-11:00

- 生活上の注意については、別冊のパンフレットもご参照ください。
- ご不明な点がある場合は、遠慮なく医療スタッフにお尋ねください。

薬剤師