

# アービタックス®(セツキシマブ)

## ◆点滴に使用する薬と点滴時間

- 初回 : 2時間15分
- 2回目以降 : 1時間15分

使用する薬	外観	点滴時間
過敏症予防 デカドロン®、ポララミン®		15分
アービタックス® 初回 : 400mg/m² 2回目以降 : 250mg/m²		初回 : 2時間 2回目以降 : 1時間

- 薬の量は、副作用の程度などにより変更されることがあります。
- 点滴時間はあくまで目安であり、時間が前後することがあります。
- 過敏症予防のポララミン®による眠気が出ることがあるため、ふらつき、転倒に注意し、投与当日の車の運転は行わないでください。

## ◆スケジュール

7日間を1コースとして、治療を繰り返します。

## ◆ 主な副作用

### 皮膚障害

アービタックス®により、にきびのような発疹、かゆみ、乾燥、爪の周りの炎症などの皮膚障害が現れることができます。

副作用の詳細や、対策方法、生活上の注意点については、別冊のパンフレットをご参照ください。

## ◆ 点滴中

下記の赤字の症状があるときは、すぐに医療スタッフへお声かけください。

## 過敏反応（アレルギー）

寒気、吐き気、頭痛、めまい、発疹、息苦しい

治療開始1～2回目が起きやすいですが、治療を繰り返していても現れることがあります。

## 血管外漏出

点滴が漏れている、針を刺したところが痛い、熱っぽい、赤く腫れている、違和感がある

## ◆ 1～2週間頃

### 下痢

普段より1日4回以上多く排便がある、または1回でも水のような便があるときは、[下痢止めを使用](#)することができます。

強い腹痛や発熱を伴う場合、医師から処方された下痢止めで改善しない場合は、ご連絡ください。

## ◆ 検査でわかる副作用

### 低マグネシウム血症

血中の電解質マグネシウムが低下することがあります。マグネシウムが低下すると、食欲が低下する、脱力感、しびれやふるえなどの症状が出ることがあります。

定期的な血液検査を行い、低い場合は点滴でマグネシウムを補充することがあります。

## 【血液検査について】

副作用の確認のために、定期的な血液検査を行います。

## ◆ 緊急時の連絡方法

困ったことがあったときは、下記にご連絡ください。

気持ち悪くて水分も摂れない  
下痢が止まらない  
37.5°C以上の発熱が続いている  
薬の使用方法がわからない

など



診察券を用意する

代表：044-977-8111 に電話をかける

平日：8:30-17:00  
土曜日：8:30-12:30

腫瘍センター  
ナースステーション

夜間帯・休診日  
など左記以外の時間

各診療科の当直医

## ◆ 予約外受診の方法

病院本館正面玄関を入って右手の  
「②再診受付」または「予約外受付機」で手続きした後、  
各診療科の外来でお待ちください。

※受付時間：平日8:30-11:30 土曜日8:30-11:00

- 生活上の注意については、別冊のパンフレットもご参照ください。
- ご不明な点がある場合は、遠慮なく医療スタッフにお尋ねください。

薬剤師