

ガザイバ®

◆ 点滴に使用する薬と点滴時間

- 初回 : 5時間30分
- 2回目以降 : 4時間15分

使用する薬	外観	点滴時間
過敏症予防① ソル・メドロール®		30分
過敏症予防② ポララミン®		30分
過敏症予防③ アセトアミノフェン		〔 ガザイバ®開始 30分前に内服 〕
ガザイバ® 1000 mg/Body		• 初回 : 4時間30分 • 2回目 : 3時間15分

- 過敏症予防のポララミン®による眠気が出ることもあるため、ふらつき、転倒に注意し、投与当日の車の運転は行わないでください。
- 薬の量は、副作用の程度などにより変更されることがあります。
- 点滴時間はあくまで目安であり、時間が前後することがあります。

◆ スケジュール

導入療法

- 1コース目は、1・8・15日目に点滴し、2コース目以降は1日目のみ点滴します。
 - CHOPまたはCVP療法と併用 : 21日間を1コースとします。
 - ベンダムスチンと併用 : 28日間を1コースとします。

維持療法

- 8週間を1コースとします。

◆ 点滴中

下記の赤字の症状があるときは、すぐに医療スタッフへお声かけください。

過敏反応（アレルギー）

寒気、吐き気、頭痛、めまい、発疹、息苦しい

治療開始1～2回目が起きやすいですが、治療を繰り返していても現れることがあります。

血管外漏出

点滴が漏れている、針を刺したところが痛い、熱っぽい、赤く腫れている、違和感がある

◆ 緊急時の連絡方法

困ったことがあったときは、下記にご連絡ください。

気持ち悪くて水分も摂れない
下痢が止まらない
37.5℃以上の発熱が続いている
薬の使用方法がわからない

など



診察券を用意する

代表：044-977-8111 に電話をかける

平日：8:30-17:00
土曜日：8:30-12:30

血液内科の
主治医または担当医

夜間帯・休診日
など左記以外の時間

血液内科の当直医

◆ 予約外受診の方法

病院本館正面玄関を入れて右手の
「②再診受付」または「予約外受付機」で手続きした後、
各診療科の外来でお待ちください。

※受付時間：平日8:30-11:30 土曜日8:30-11:00

- 生活上の注意については、別冊のパンフレットもご参照ください。
- ご不明な点がある場合は、遠慮なく医療スタッフにお尋ねください。

薬剤師