

ダカルバジン®

◆点滴に使用する薬と点滴時間

- 1-5日目：1時間15分

使用する薬	外観	点滴時間	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
吐き気止め アロキシ® デカドロン®		15分	●	● アロキシ® なし	● アロキシ® なし	● アロキシ® なし	● アロキシ® なし
ダカルバジン® 250mg/m ²		1時間	●	●	●	●	●
ソルデム®3A (血管痛予防)		ダカル バジン® 投与中 継続	●	●	●	●	●

- 薬の量は、副作用の程度などにより変更されることがあります。
- 点滴時間はあくまで目安であり、時間が前後することがあります。

◆ スケジュール

21日間を1コースとして、治療を繰り返します。

◆ 吐き気止めの飲み方

- 症状があってもなくても、必ずお飲みください。

お薬の名前	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
アプレピタント カプセル 1日目：125mg 2~5日目：80mg	 抗がん剤の 1時間前			1回 1カプセル 1日 1回 朝食後	

- 他の薬剤の効果に影響を与える可能性があるため、他の病院を受診される際は、本剤を服用していることをお伝えください。

お薬の名前	1日目	2日目	3日目	4日目
オランザピンOD錠 5mg 				1回 1錠 1日 1回 夕食後

- 眠気、めまい、動悸、立ちくらみが起こることがあります。薬を内服している間は、自動車の運転などを避けてください。
- 糖尿病の方、糖尿病と言われたことのある方は、この薬を服用することはできません。

◆ 主な副作用

白血球減少

白血球が減少すると免疫力が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。

治療開始1～2週間後に白血球の値が最も低くなり、その後1～2週間かけて回復します。

うがい・手洗いなどの感染予防を心がけましょう。

37.5度を超える発熱時、医師からあらかじめ処方された薬がない方は、病院へご連絡ください。

赤血球減少

貧血になり、めまい、だるさ、動悸、息切れなどの症状があらわれます。治療開始2～4週間頃に低くなります。

必要に応じて、薬で治療したり輸血があります。

血小板減少

血液が固まりにくくなり、歯茎からの出血や鼻血が出やすくなります。治療開始1～2週間後に血小板の値が最も低くなり、その後1～2週間かけて回復します。

転倒やケガに注意してください。

必要に応じて、輸血があります。

【血液検査について】

副作用の確認のために、定期的な血液検査を行います。

◆点滴中

下記の赤字の症状があるときは、すぐに医療スタッフへお声かけください。

過敏反応（アレルギー）

寒気、吐き気、頭痛、めまい、発疹、息苦しい

治療開始1～2回目が起きやすいですが、治療を繰り返していても現れることがあります。

血管外漏出

点滴が漏れている、針を刺したところが痛い、熱っぽい、赤く腫れている、違和感がある

※血管痛・静脈炎

薬の種類によっては、点滴が漏れていなくても血管痛を起こすことがあります。また点滴終了後、血管のつっぱり感、硬くなる、色素沈着などの静脈炎が起こるがあります。

点滴前にホットパックで腕を温めるなどの対応を行うことがあります。治療のたびに起こる血管痛がつらい場合や静脈炎がひどい場合は、主治医や医療スタッフにご相談ください。

◆点滴終了後～1週間頃

吐き気・嘔吐・食欲不振

必要に合わせて、吐き気止めでしっかりと予防を行っています。それでも症状がある場合は、**吐き気止めを追加で使用**することがあります。**水分が摂れないほど吐き気・嘔吐がひどい場合は、ご連絡ください。**

便秘

お腹の動きが悪くなり、便が固くなったりお腹がはることがあります。食事や水分摂取、適度な運動でも改善しない場合、**下剤を使用**します。

倦怠感（だるさ）

疲れやすい、気力がない、体が重いなどの症状で、日常生活に支障が出る場合は、診察時に主治医へご相談ください。

◆ 1～2週間頃

口内炎

口の中がヒリヒリする、しみる、痛くなることがあります。**歯みがきやうがいで口の中を清潔に保ち、乾燥を防ぐことが大切です。**またうがい薬や塗り薬を使用することができます。**がまんできない、水分もとれないほどの口の中の痛み**がある場合は、病院へご連絡ください。

◆ 2~3週間頃

脱毛

薬の種類によって抜けやすさは異なりますが、1~2か月後にはかなり目立つようになります。

髪の毛以外（まゆ毛、まつ毛など）全身の体毛も同様に抜けます。治療が終了すると、少しずつですが生えてきます。

◆ 蓄積性の副作用

色素沈着

皮膚に日焼けのようなしみができる、爪が黒ずむ

味覚障害

味を感じにくくなる、塩味を強く感じる、金属味がする、まずく感じるなど味覚に異常が出ることがあります。

● その他の副作用

非常にまれな副作用ですが、万が一赤字の症状がある場合は、すぐに病院へご連絡ください。

間質性肺炎

たんが絡まない乾いた咳、息苦しい、発熱

肝機能障害

定期的な血液検査を行います。

白目や皮膚が黄色くなる（黄疸）、ひどいだるさ

◆ 緊急時の連絡方法

困ったことがあったときは、下記にご連絡ください。

気持ち悪くて水分も摂れない
下痢が止まらない
37.5°C以上の発熱が続いている
薬の使用方法がわからない

など



診察券を用意する

代表：044-977-8111 に電話をかける

平日：8:30-17:00
土曜日：8:30-12:30

腫瘍センター
ナースステーション

夜間帯・休診日
など左記以外の時間

各診療科の当直医

◆ 予約外受診の方法

病院本館正面玄関を入って右手の
「②再診受付」または「予約外受付機」で手続きした
後、各診療科の外来でお待ちください。

※受付時間：平日8:30-11:30 土曜日8:30-11:00

- 生活上の注意については、別冊のパンフレットもご参照ください。
- ご不明な点がある場合は、遠慮なく医療スタッフにお尋ねください。

薬剤師