

血栓治療薬と手術・検査前の推奨休薬期間

(赤字は当院採用薬品)

下記の推奨休薬期間はあくまでも目安です。

出血時間やプロトロンビン時間の確認を行い、患者の状態や、手術、検査、処置による侵襲や出血の程度などを考慮して、総合的に判断すること。

また、投与を中止することにより、疾患に悪影響を及ぼす危険性もあることから、症状を確認の上、休薬期間を設定すること。

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
血小 板凝 集抑 制剤	アスピリン	アスピリン	バイアスピリン	1週間以上
		バファリン		
		タケルダ配合錠★		
		キャブピリン配合錠		
	イコサペント酸エチル	エパデールS	イコサペント酸 エチル	7～10日前
	オザグレル塩酸塩	ドメナン	オザグレル	1日前
	オメガー3脂肪酸エチル	ロトリガ		7～10日前
	クロピドグレル硫酸塩	プラビックス	クロピドグレル	14日以上前
		コンプラビン★ (クロピドグレル +アスピリン)	ロレアス	14日以上前
	チカグレロル	ブリリント		5日以上前
	サルポグレラート塩酸塩	アンブラーグ	サルポグレラート 塩酸塩	1日前
	シロスタゾール	プレタールOD	シロスタゾールOD	2～4日前
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン	チクロピジン	10～14日前
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント		14日以上前
抗凝 固剤	ベラプロストナトリウム	プロサイリン ドルナー ベラサスLA ケアロードLA	ベラプロスト ナトリウム	1日前
		オパルモン プロレナール	リマプロスト アルファデクス	1日前
	アピキサバン	エリキュース		低リスク 1日以上前 中～高リスク 2日以上前
	エドキサバン	リクシアナ		1日以上前
	ダビガトランエテキシラー トメタスルホン酸塩	プラザキサ		1日前 (大手術 2日以上前)
	ヘパリンナトリウム	ヘパリンナトリウム		4～6時間前
	ヘパリンカルシウム	ヘパリンカルシウム		12時間前
	リバーロキサバン	イグザレルトOD		1日以上前

	ワルファリンカリウム	ワーファリン		2～4日前
冠血管拡張剤	ジピリダモール	ペルサンチン	ジピリダモール	1日前
	シラゼプ塩酸塩	コメリアンコーワ	シラゼプ塩酸塩	3日前
	トラピジル	ロコルナール	トラピジル	2日前
	トリメタジジン塩酸塩	バスタレルF		不明 (血小板凝集抑制作用)
脳循環代謝改善薬	イフェンプロシル酒石酸塩	セロクラール	イフェンプロシル酒石酸塩	2日前
	イブジラスト	ケタス★		3日前
	ニセリトロール	ペリシット		1日前
	ニセルゴリン	サアミオン	ニセルゴリン	2日前

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン酢酸エチル	ヒスロンH錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg	禁忌：術後1週間
低用量ピル	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	シンフェーズ		禁忌：術前4週間 術後2週間
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	アンジュ★ ラベルフィーユ トリキュラー		禁忌：術前4週間 術後2週間
	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	マーベロン ファボワール		禁忌：術前4週間 術後2週間
卵胞・黄体ホルモン配合剤	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	ヤーズ配合錠★ ヤーズフレックス 配合錠★		禁忌：術前4週間 術後2週間
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	ルナベル配合錠★	フリウェル配合錠	禁忌：術前4週間 術後2週間
	ノボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	ジェミーナ配合錠		禁忌：術前4週間 術後2週間
卵胞ホルモン	結合型エストロゲン	プレマリン錠		慎重投与：術前4週間
ホルモン類似製剤	ラモキシフェン	エビスタ★		ジャディアンS
	バセドキシフェン塩酸塩	ビビアント★		長期不動状態に入る前に 休薬し、完全歩行可能に なるまで再開しない

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
----	-----	-------	-------	--------

S G L T 2 阻 害 薬	イプラグリフロジ ン L-プロリン	スーグラ	スージャヌ配合錠 ★	術前3日前
	エンパグリフロジン	ジャディアンス	トラディアンス配 合錠★	
	カナグリフロジン	カナグル	カナリア配合錠★	
	ダパグリフロジン	フォシーガ		
	トホグリフロジン	デベルザ		
	ルセオグリフロジン	ルセフィ		

2022年4月