

血栓治療薬と手術・検査前の推奨休薬期間

(赤字は当院採用薬品)

下記の推奨休薬期間はあくまでも目安です。
出血時間やプロトロンビン時間の確認を行い、患者の状態や、手術、検査、処置による侵襲や出血の程度などを考慮して、総合的に判断すること。
また、投与を中止することにより、疾患に悪影響を及ぼす危険性もあることから、症状を確認の上、休薬期間を設定すること。

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
血小板凝集抑制剤	アスピリン	アスピリン	バイアスピリン	1週間以上
		バファリン		
		タケルダ配合錠★		
		キャブピリン配合錠		
	イコサペント酸 エチル	エパデールS	イコサペント酸 エチル	7～10日前
	オザグレル塩酸塩	ドメナン	オザグレル	1日前
	オメガー3脂肪酸エチル	ロトリガ		7～10日前
	クロピドグレル硫酸塩	プラビックス	クロピドグレル	14日以上前
		コンプラビン★ (クロピドグレル +アスピリン)	ロレアス	14日以上前
	チカグレロル	ブリリント		5日以上前
	サルボグレラート塩酸塩	アンブラーグ	サルボグレラート 塩酸塩	1日前
	シロスタゾール	プレタールOD	シロスタゾールOD	2～4日前
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン	チクロピジン	10～14日前
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント		14日以上前
抗凝固剤	ベラプロストナトリウム	プロサイリン ドルナー ベラサスLA ケアロードLA	ベラプロスト ナトリウム	1日前
		オパルモン プロレナール	リマプロスト アルファデクス	1日前
	アピキサバン	エリキュース		低リスク 1日以上前 中～高リスク 2日以上前
	エドキサバン	リクシアナ		1日以上前
	ダビガトランエテキシラー トメタスルホン酸塩	プラザキサ		1日前 (大手術 2日以上前)
	ヘパリンナトリウム	ヘパリンナトリウム		4～6時間前
	リバーロキサバン	イグザレルト		1日以上前

	ワルファリンカリウム	ワーファリン		2～4日前
冠 血 管 拡 張 剤	ジピリダモール	ペルサンチン	ジピリダモール	1日前
	ジラゼブ塩酸塩	コメリアンコーワ	ジラゼブ塩酸塩	3日前
	トラピジル	ロコルナール	トラピジル	2日前
	トリメタジジン塩酸塩	バスタレルF		不明 (血小板凝集抑制作用)
脳 循 環 代 謝 改 善 薬	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	イフェンプロジル 酒石酸塩	2日前
	イブジラスト	ケタス★		3日前
	ニセリトロール	ペリシット		1日前
	ニセルゴリン	サアミオン	ニセルゴリン	2日前

分類	一般名	先発薬品名	後発薬品名	推奨休薬期間
黄 体 モ ン ホ ル	メドロキシプロゲステロン酢 酸エチル	ヒスロンH錠	メドロキシプロ ゲステロン 酢酸エステル錠 200mg	禁忌：術後1週間
	ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール	シンフェーズ		禁忌：術前4週間 術後2週間
	レボノルゲストレル・エチ ニルエストラジオール	アンジュ★ ラベルフィーユ ジェミーナ配合錠 トリキュラー		禁忌：術前4週間 術後2週間
	デソゲストレル・エチニル エストラジオール	マーベロン ファボワール		禁忌：術前4週間 術後2週間
卵 胞 ・ 黄 体 ホ ル モ ン 配 合 剤	ドロスピレノン・エチニル エストラジオール	ヤーズ配合錠★ ヤーズフレックス 配合錠★		禁忌：術前4週間 術後2週間
	ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール	ルナベル配合錠★	フリウエル配合錠	禁忌：術前4週間 術後2週間
ホ ル モ ン 類 似 製 剤	ラモキシフェン	エビスタ★		禁忌：術前3日-術後歩行 開始まで
	バセドキシフェン塩酸塩	ビビアント★		長期不動状態に入る前に 休薬し、完全歩行可能に なるまで再開しない